



Impfungen und Titerbestimmung beim Hund

Impfungen gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose und Zwingerhusten werden in der Schweiz für alle Hunde empfohlen. Ziel der Impfungen ist es, dass ein Tier nicht oder zumindest weniger schwer krank wird, wenn es mit einem Krankheitserreger in Kontakt kommt.

Impfungen wirken besser bei Tieren, die keine Wurminfektionen haben. Es ist daher ratsam, Ihren Hund ein bis zwei Wochen vor der Impfung zu entwurmen. Impfungen sind auch bei Tieren mit einer akuten Krankheit weniger wirksam und können den Gesundheitszustand noch verschlechtern. Deshalb wird Ihr Hund vor jeder Impfung zuerst vom Tierarzt untersucht.

Erwachsene Hunde sollten jedes Jahr durch einen Tierarzt untersucht und geimpft werden. Allerdings sind nicht jedes Jahr alle Impfungen notwendig da die Dauer vom Impfschutz variiert. Wenn Sie ihren Hund nicht unnötig impfen lassen möchten, kann der aktuelle Impfschutz von Parvovirose, Staupe und Hepatitis gemessen werden.

Titerbestimmung

Der Gehalt an Abwehrkörpern ist messbar, dies nennt man eine Titerbestimmung. Hat ein Tier genügend Abwehrkörper, so ist eine Impfung überflüssig. Dieser Test ist zuverlässig für Parvovirose, Staupe und Hepatitis, aber nicht für Leptospirose und Zwingerhusten. Die letzten zwei Impfungen werden nach wie vor jährlich empfohlen.

Manche Welpen sind nach der Grundimmunisierung immer noch nicht ausreichend geschützt. Mit diesem Test kann ab vier Wochen nach der letzten Impfung der Impfschutz gemessen und so bei ungenügendem Schutz schnell reagiert werden.

Obwohl die Impfung von Hunden fast immer gut vertragen wird, kann es vereinzelt zu Nebenwirkungen kommen. Für diese Hunde bietet eine Titerbestimmung eine gute Alternative, um so wenig wie möglich zu impfen und trotzdem die Gewissheit zu haben, dass Ihr Tier gut geschützt ist.

Neu bieten wir diesen Test bei uns an! Dafür wird eine kleine Menge Blut entnommen, das Resultat erhalten Sie innerhalb einer Woche. Bei einem ausreichenden Titer ist ihr Hund für mindestens drei Jahre geschützt gegen Parvovirose, Staupe und Hepatitis. Drei Jahre später kann der Test wiederholt oder einfach wieder geimpft werden. Wir empfehlen weiterhin eine jährliche Gesundheitskontrolle und die Impfungen gegen Leptospirose und Zwingerhusten.

Bei Fragen zögern sie nicht uns an zu rufen, wir beraten sie gerne!